

# Personas que Mueren por Suicidio: La Importancia del Género y el Abuso de Sustancias

Carolina Inostroza<sup>1, 2</sup>

Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción

Sandra Saldivia

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción

Ma. Andrea Rodríguez

Departamento de Ingeniería Informática y Cs. de la Computación, Facultad de Ingeniería,  
Universidad de Concepción

Juan Zuchel

Departamento de Anatomía Normal y Medicina Legal, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción

Luis Izquierdo

Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción

Ponencia Libre presentada en el VII Congreso Anual de la Sociedad Científica de Psicología de Chile  
Organizado por la Universidad de Concepción, Modalidad Virtual, Chile, 13 y 14 de mayo de 2021

El suicidio es un problema de salud pública mundial. En Chile, la tasa fue de 14,7 muertes por cada 100.000 habitantes durante el período 2001-2010; para su reducción se crea el Programa Nacional de Prevención del Suicidio (MINSAL, 2013). Los objetivos de este estudio fueron analizar las tasas de suicidio por sexo y edad y describir antecedentes de consumo/abuso de sustancias pre y *perimortem* en las personas que murieron por suicidio en la Provincia de Concepción entre los años 2008 y 2017. Para esto, se extrajeron, categorizaron y analizaron los datos sociodemográficos, antecedentes de consumo/abuso de sustancias, alcoholemia y toxicología de los protocolos de autopsia de los casos catalogados como suicidio en el Servicio Médico Legal de Concepción. Se analizaron diferencias por sexo en las características estudiadas. Para estimar tasas por sexo y edad se contrastaron los datos con las bases de defunciones del DEIS. Se encontraron 876 suicidios durante el periodo estudiado, con una tasa promedio anual de 8,80 por 100.000 habitantes. Se observan diferencias por sexo y edad: ocurren 4,9 casos de suicidios en hombres por cada mujer; la menor tasa es de adolescentes mujeres y la mayor de hombres mayores de 70 años. Un 56% cometió suicidio bajo la influencia de una droga, en su mayoría alcohol, y la mayoría tiene antecedentes de consumo de sustancias; ambos con diferencias de género hacia los hombres. Las diferencias en las tasas de suicidio por sexo y edad, y su asociación con consumo de sustancias resalta la necesidad de utilizar estrategias de prevención focalizadas.

*Palabras clave:* suicidio, género, abuso de sustancias, Chile

---

<sup>1</sup> [caroinostroza@udec.cl](mailto:caroinostroza@udec.cl)

<sup>2</sup> Se reconoce el apoyo del Fondo de investigación de la Universidad de Concepción VRID Asociativo 218.172.023-10.